

- β. *R. Indica paniculata*. (N.) Vulg. le *R. des Indes*, ou du *Bengale paniculé*. Variété du jardin de M. BOURSALT, remarquable par ses pédoncules allongés très-rameux, et la couleur admirable de ses fleurs.
- γ. *R. Indica cruenta*. RED. R. 1, p. et fig. 123. Vulg. *la Bengale sanguine*.
- δ. *R. Indica chremesina*. (N.) Vulg. *la Bengale cramoisie*. Fleurs souvent solitaires; folioles bordées d'un brun-rougâtre. On connaît, de cet arbuste, des sous-variétés à fleurs pourpres de différentes nuances. Il en est une dont les pétales sont presque violets, vulg. *la Bengale violette*, et une autre à fleurs toujours prolifères, vulg. *la Bengale prolifère*. M. NOISSETTE en possède une riche collection.
- ε. *R. Indica subinermis*. (N.) *R. Bengalensis inermis* des pépinières de M. NOISSETTE, ou *la Bengale sans épines*. Aiguillons rares sur les tiges; souvent elles en sont privées. Trois ou quatre fleurs à l'extrémité des rameaux.
- ζ. *R. Indica cerasi-coloris*. (N.) *La Bengale cerise*. Ne diffère de la précédente que par ses tiges aiguillonnées, et ses pétales d'un pourpre plus clair, blancs vers l'onglet.

## \*\* Fleurs roses.

- α. *R. Indica rosea flore simplici*. *La Bengale rose à fleurs simples*, de la pépinière de M. NOISSETTE. Se rapproche de la var. α. Ses pétales rougissent en finissant.
- θ. *R. Indica vulgaris*. RED. R. 1, p. et fig. 51. Vulg. le *Rosier du Bengale*; le *Rosier de la Chine*; le *Rosier fleuri*; *la Bengale semi-double*; *la Bengale toujours en fleurs*; *la Bengale à feuilles variables*. Cette espèce est la plus répandue.
- ι. *R. Indica multipetala*. RED. R. 2, p. et fig. 35.
- κ. *R. Indica dichotoma*. (N.) Les divisions et subdivisions, par bifurcation, des pédoncules des fleurs, dans cette variété, la distinguent de toutes les autres. C'est le *R. Animating*, ou *la Bengale animée* des Anglais. Vulg. *la Bengale dichotome*.
- λ. *R. Indica fragrans*. RED. R. 1, p. et fig. 61.
- μ. *R. Indica acuminata*. RED. R. 1, p. et fig. 53.
- ν. *R. Indica pumila fl. simpl.* RED. R. 2, p. et fig. 25.
- ξ. *R. Indica pumila fl. mult.* RED. R. 1, p. et fig. 115.
- ο. *R. Indica longifol.* RED. R. 2, p. et fig. 27.
- π. *R. Indica LAWRENCIANA*. (N.) *R. semperflorens minima* (Miss LAWRENCE's Rose.) CURT. Bot. Mag. p. et fig. 1762. Tiges couvertes d'aiguillons assez rapprochés, et de glandes pédicellées. Les pétales à-peu-près semblables à ceux de la var. α. Vulg. *la Bengale de miss LAWRENCE*.
- ρ. *R. Indica sertulata*. (N.) Fleurs doubles d'un rose-tendre approchant du blanc, disposées en une espèce d'ombelle. Obtenue de graines à Trianon, où on la nomme *Bengale à bouquets*. Elle diffère de la suivante en ce que les pétales, en finissant, ne deviennent pas absolument blancs, et qu'ils conservent un peu de leur couleur primitive.
- σ. *R. Indica subalba*. (N.) Ses pétales d'abord d'un rose-tendre deviennent d'un blanc plus ou moins pur à l'époque du développement des fleurs. Vulg. *la Bengale de CELS*; *la Bengale unique*; *la Bengale blanche*.

## \*\*\* Fleurs panachées.

- τ. *R. Indica pannosa*. Voyez ci-dessus, p. 37.
- υ. *R. Indica variegata*. Vulg. *la Bengale rose panachée*, ou *la Bengale tigrée* des pépinières de la Belgique. Pétales couverts de taches plus foncées que le fond, et parfois de points blanchâtres.

Ces Rosiers, excepté les var. θ et ι, exigent l'orangerie l'hiver, et la terre de bruyère; ils se multiplient facilement de bouture. Tous sont toujours, ou très-souvent, en fleurs. Nous avons remarqué que les hybrides qui en proviennent ne fleurissent qu'une seule fois dans l'année. Telles sont la *Rose Phil. NOISSETTE*, qui est hybride du *Bengale* et de la *Rose Muscade*; la *Rose Boursault*, issue aussi du *Bengale* et d'un *Rosier des Alpes*, etc.